




کلینیک فروردین
FARVARDIN DENTAL CLINIC



مراقبت های پس از جراحی ایمپلنت

FARVARDIN

DENTAL CLINIC



۰۲۱ ۶۶ ۳۶ ۲۳ ۳۴

۰۲۱ ۶۶ ۳۶ ۲۲ ۱۲

۰۲۱ ۹۲ ۲۰ ۰۰ ۰۶۰

 farvardin_dentalclinic

 f-dentalclinic.ir





سعی کنید تا ۲۴ ساعت پس از جراحی استراحت کنید

روز اول غذای سرد، نرم و سبک میل نمایید

تف نکنید و در صورت نیاز به آرامی آب دهان خود را تخلیه کنید

داروهای تجویز شده توسط دندانپزشک را طبق دستور استفاده نمایید و از مصرف خودسرانه دارو

بپرهیزید

روز اول دهان را شستشو ندهید

مشروبات الکلی مصرف نکنید

تا یک هفته سیگار نکشید

اگر در جراحی از بیهوشی استفاده شده به هیچ وجه رانندگی نکنید

در صورت تجویز دهان شویه کلرهگزیدین، نخست مسواک زده سپس دهان را با آب نمک رقیق و گرم

شستشو داده، آنگاه به مدت ۳۰ ثانیه دهان شویه را در دهان غرغره نموده و بعد از بیرون ریختن آن تا

۳۰ دقیقه از خوردن نوشیدنی یا غذا اجتناب کنید

بعد از هر وعده غذایی با احتیاط مسواک زده و دهان خود را شستشو دهید

تا یک هفته از فعالیت‌های سنگین و ورزشی بپرهیزید

۷-۱۰ روز بعد، برای کشیدن بخیه‌ها به کلینیک مراجعه نمایید

در صورت وجود جراحی ایمپلنت به همراه جراحی سینوس لیفت از فشار بر ناحیه بینی و دستگاه

تنفسی خودداری کنی



عوارض احتمالی

- درد، تب و لرز خفیف (طبیعی است و از مسکن تجویز شده توسط دندانپزشک استفاده کنید)
- تراوش خونابه (طبیعی است و یک تکه گاز استریل را در محل قرار داده و ۲۰ دقیقه فشار دهید)
- خونریزی (به کلینیک مراجعه نمایید)
- تورم (بعد از ۲۴ ساعت ناحیه را کمپرس گرم نمایید)
- شل شدن قسمت خارج لثه‌ای (سریعا به کلینیک مراجعه کنید)

(شبانه روزی)

کلینیک دندانپزشکی فروردین

