



کلینیک فروردین
FARVARDIN DENTAL CLINIC



مراقبت های پس از پروتز ثابت

FARVARDIN

DENTAL CLINIC



۰۲۱ ۶۶ ۳۶ ۲۳ ۳۴

۰۲۱ ۶۶ ۳۶ ۲۲ ۱۲

۰۲۱ ۹۲ ۲۰ ۰۰ ۰۶۰

 farvardin_dentalclinic

 f-dentalclinic.ir





با توجه به ترمیم کل دندان یا مقداری از دندان با استفاده از روکش‌ها ممکن است شکل قرارگیری دندان‌ها بر روی هم تغییر نماید که نیاز است به عضلات جونده فرصتی داده شود تا خود را با این تغییرات هماهنگ کند. لذا در روزهای اول از غذای نرم استفاده شود

مسواک و نخ دندان طبق توصیه پزشک باید مرتب انجام شود و جهت بریج‌ها استفاده از نخ، زیر بریج و مسواک‌های بین دندانی و یا واترجت ضروری می‌باشد

محل قرارگیری روکش بر روی دندان (مارجین روکش) آسیب پذیرترین قسمت روکش بوده که باید به خوبی تمیز شود و در ۶ ماه توسط دندانپزشک مورد بازبینی قرارگیرد و در صورت نیاز رادیوگرافی تهیه شود



(شبانه روزی)

کلینیک دندانپزشکی
فروردین

